

Bord postérieur du telson muni de trois paires de soies plumeuses, s'insérant toutes entre les deux épines internes.

Épipodite des maxillipèdes I bilobé, les deux lobes étant indiqués seulement par une échancrure large et peu profonde.

Pattes I dépassant l'extrémité antérieure des scaphocérites.

Bord postérieur du telson muni de deux paires de soies plumeuses, s'insérant l'une entre les deux épines internes, l'autre entre les épines externes et les épines internes.

Épipodite des maxillipèdes I non bilobé.

Pattes I n'atteignant pas l'extrémité antérieure des scaphocérites.

Indications de provenance : *Ps. Bouvieri*, Montevideo, eau douce; *Ps. Iheringi*, Arroyo del Bellaco, Brésil. J'ai cherché en vain, dans les riches collections du Muséum, d'autres représentants du genre *Pseudopalæmon*; il est donc possible que le genre soit localisé dans les eaux douces de l'Amérique du Sud.

SUR DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE CIRRHIPÈDES
APPARTENANT À LA COLLECTION DU MUSÉUM,

PAR M. A. GRUVEL.

Parmi les Cirrhipèdes que je viens de déterminer, appartenant à la collection du Muséum, se trouvent deux formes nouvelles, un pédonculé et un operculé asymétrique.

GENRE *Scalpellum*.

S. Pilsbryi nov. sp.

Diagnose. — Capitulum avec 15 plaques parfaitement calcifiées recouvertes par une cuticule mince, avec des poils extrêmement courts et fins. Carène droite avec l'apex très pointu et brusquement recourbé en avant portant des côtes longitudinales et quelques stries transversales assez espacées. Scuta triangulaires isocèles à apex très pointu, d'où partent des côtes et stries très nettes, se dirigeant vers la base, ainsi que quelques stries transversales. Terga quadrangulaires à apex pointu, avec une arête double partant de l'apex, se dirigeant vers la base et délimitant deux parties triangulaires, à moitié recouvertes, d'une part par les scuta et de l'autre par la carène. Côtes longitudinales peu marquées sur la moitié carénale seulement. Rostre triangulaire, à apex pointu assez fortement recourbé en haut avec une côte médiane, large et aplatie, allant de l'apex à la base. Deux sous-

rostres formés d'écaillés plus développées que les autres et nettement distinctes.

Sous-carène triangulaire et pointue, à apex relevé, presque moitié plus petite que le rostre et sans arête médiane.

Trois paires de plaques latérales égales entre elles et aussi, à peu près, à la sous-carène, à apex relevé et formant : une paire de supra-latérales, une paire de rostro-latérales et une paire de caréno-latérales.

Pédoncule assez court avec écailles arrondies, non imbriquées.

Dimensions. — Capitulum : hauteur, 11 millimètres ; largeur maxima, 10 millimètres. — Pédoncule : longueur, 7 millimètres ; largeur moyenne, 5 millimètres.

Distribution. — Dragage du *Talisman* (1883) par 882 mètres de fond, au Sud du cap Bojador, sur Bryozoaires.

GENRE *Verruca*.

V. spongicola nov. sp.

Diagnose. — Plan scuto-tergal mobile, à peu près perpendiculaire à la base. Test blanc, très mince et friable ; stries d'accroissement parallèles à la base, très fines et à peine saillantes. Scutum triangulaire, étroit, avec une arête articulaire peu saillante limitant le bord tergal ; stries d'accroissement très fines et à peine sensibles ; apex plutôt pointu. Tergum losangique, à apex mousse, avec l'arête axiale carrée et légèrement saillante. L'apex du tergum dépasse celui du scutum d'environ un tiers de la hauteur de la première pièce. Stries d'accroissement du tergum fines et peu saillantes.

Carène et rostre à peu près de même hauteur, celle-ci dépassant celle du tergum mobile, ce qui est un caractère unique chez les *Verruca* actuellement connues, dû, très probablement, à la protection assurée efficacement par l'éponge dans laquelle vit l'animal. Chacune de ces pièces (carène et rostre) porte trois dents articulaires, prolongées par des arêtes à peine saillantes.

Tergum et scutum fixes moins élevés que la carène et le rostre avec la paroi triangulaire, à apex mousse, à stries transversales fines et à peine saillantes, sans stries longitudinales. Les ailes sont larges, triangulaires et finement striées.

Dimensions. — A R à A G : 2 millimètres ; A T à B : 1 millim. 5.

Distribution. — Cette très curieuse espèce, à laquelle j'ai donné le nom de *spongiloca*, pour rappeler son habitat, se trouvait au milieu d'une éponge rejetée sur le récif extérieur de l'île Timoë (archipel des Gambier) et recueillie par M. Seurat.

Il existe deux exemplaires, dont l'un a perdu son plan scuto-tergal mobile.

EXPÉDITION ANTARCTIQUE FRANÇAISE DU POURQUOI-PAS,
DIRIGÉE PAR M. LE D^r J.-B. CHARCOT (1908-1910).
LISTE DES CIRRHIPÈDES,

PAR M. A. GRUVEL.

Le nombre des Cirrhipèdes recueillis par la dernière Mission du D^r Charcot compte seulement quatre espèces, qui sont extrêmement communes et ne présentent, par conséquent, qu'un très faible intérêt.

Le seul Cirrhipède pédonculé représenté est le *Conchoderma auritum* L., recueilli en très grande quantité sur *Balaenoptera borealis* et sur *Megaptera longimana*, aux Shetland et à l'île Déception (janvier 1910).

Parmi les Operculés, je dois citer d'abord un très grand nombre de *Coronula diadema* L. recueillis sur les mêmes animaux et dans les mêmes régions que le *Conchoderma auritum*.

Puis, une très grande quantité de *Chthamalus antematus* Darw. fixés sur des rochers littoraux à Port-Galant (détroit de Magellan) [Patagonie]. Dans cette même localité, M. Gain a recueilli, également sur les rochers, beaucoup d'*Ebminius Kingi* Gray.

SYNOPSIS DES PHILOREA,
COLÉOPTÈRES TÉNÉBRIONIDES DE LA TRIBU DES PHYSOGASTÉRIENS,

PAR M. P. LESNE.

Au cours des dernières années, M. le D^r Escomel a fait parvenir au Muséum plusieurs envois d'Insectes provenant du Pérou méridional, région d'Arequipa. Bien qu'ils ne comprennent qu'un nombre restreint d'espèces et d'individus, ces envois offrent beaucoup d'intérêt pour les collections de notre Établissement, car ils révèlent l'existence dans cette région d'une faune entomologique spéciale et qui paraît être en grande partie ignorée.

M. P. Denier a fait connaître tout récemment⁽¹⁾ un Coléoptère nouveau appartenant à la famille des Méloïdes et au genre *Pseudomeloë*, qui provient des récoltes de M. Escomel. On trouvera ci-dessous les descriptions de deux Ténébrionides de même origine appartenant à la tribu des Physogastériens et au genre *Philorea*.

On sait que ce genre a été fondé en 1834 par Erichson pour une espèce (*P. picipes* Er.) recueillie par le naturaliste Meyen dans l'Extrême-Sud du Pérou. Depuis cette époque les travaux des entomologistes n'ont pas fait connaître de formes nouvelles du même type, car la description du

⁽¹⁾ *Bulletin de la Société entomologique de France*, séance du 14 juin 1911.